


Was Sie schon immer über die Darmspiegelung wissen wollten:

Koloskopie des Dickdarms



Dauer ca.
15 - 20 min.



Die Darmspiegelung ist sicher.

Der Arzt (Gastroenterologe), der sie durchführt, muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen und sich zertifizieren lassen. Fragen Sie in der Arztpraxis nach dem Zertifikat!

Die Darmspiegelung ist schmerzfrei.

Schmerzen bei der Darmspiegelung waren gestern. Heute erhält der Patient eine kleine Schlagspritze und spürt von der Untersuchung überhaupt nichts.

Die Vorbereitung ist ganz einfach.

Nur bei einem sauber gespülten Darm kann der Arzt alle Unregelmäßigkeiten der Schleimhaut erkennen und evtl. vorhandene Polypen entfernen. Am Tag vor der Untersuchung werden 2 Liter einer neutral-schmeckenden Spülflüssigkeit getrunken.

Die Darmspiegelung dauert etwa 20 Minuten.

Sie können sich eine Kurzschlafspritze geben lassen und die Untersuchung verschlafen, oder Sie können sie auf dem Bildschirm live mit verfolgen. Der Einblick in den eigenen Darm ist faszinierend.

Die Darmspiegelung bietet Sicherheit für 10 Jahre.

Wenn keine Polypen entdeckt werden, können Sie sich mit der nächsten Vorsorgedarmspiegelung 10 Jahre Zeit lassen.

Die Darmspiegelung rettet Leben.

Sie bietet die einzigartige Möglichkeit, Polypen zu entdecken, bevor sie zu Krebs entarten, und Darmkrebs im Frühstadium zu erkennen, in dem er oft vollständig geheilt werden kann.

Das Endoskop ist ein technisches Wunderwerk.

Die Darmspiegelung wird mit einem Endoskop (Koloskop) durchgeführt. Im fingernagelbreiten Ende eines sehr dünnen Schlauchs, durch den Licht- und Übertragungskabel laufen, sitzen eine winzige Kamera, eine ebenso winzige Lichtquelle und eine kleine Drahtschlinge zum Abtragen der Polypen.

Was passiert bei der Darmspiegelung?

Während der Patient in entspannter Seitenlage liegt, führt der Arzt das Endoskop in den Darm ein und schiebt es vorsichtig bis in die Höhe des Blinddarms. Beim Zurückziehen untersucht er dann die Darmschleimhaut Zentimeter für Zentimeter auf evtl. vorhandene Unregelmäßigkeiten. Sind Polypen vorhanden, werden diese mit der Schlinge abgetragen.



FELIX BURDA
STIFTUNG